

VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																			ADOLESCENTE	ADULTO	IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS				
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 anos	11 a 19 anos	20 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIES*		
BCG ID	1 Dose	Vacinar os não vacinados anteriormente													Vacinar pessoas contactantes de hanseníase						SIM	SIM	NÃO				
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento						Vacinar os não vacinados anteriormente													SIM	SIM	SIM					
Rotavírus		Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.						CONTRAINDICADA													SIM	SIM	NÃO				
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)		Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO		Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa		Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, fazer dT)						SIM, DTPw e dT dTpa para gestantes	SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa			
Haemophilus influenzae tipo b		Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO		Vacinar os não vacinados anteriormente	Vacinar pessoas em situações especiais de risco						SIM, três primeiras doses	SIM	SIM, até 19 anos				
Poliomielite (vírus inativados)		Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO		REFORÇO	Vacinar pessoas em situações especiais de risco						SIM, três primeiras doses	SIM	SIM				
Pneumocócicas conjugadas		Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VPC10 ou VPC13), iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO		VPC10 ou VPC13 - Vacinar os não vacinados anteriormente	VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco			VPC13: uma dose	SIM, VPC10, menores de 5 anos	SIM	SIM, VPC10						
Meningocócicas conjugadas		Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO		REFORÇO		REFORÇO aos 11 anos. Para os não vacinados anteriormente: duas doses, com intervalo de 5 anos	Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, menC para menores de 5 anos e adolescentes de 11 a 14 anos	SIM	SIM, menC						
Meningocócica B		Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente – De 12 a 23 meses e 29 dias: três doses De 24 meses a 19 anos: duas doses						Vacinar pessoas em situações especiais de risco		NÃO	SIM	NÃO				
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)		CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO																			SIM	NÃO	NÃO				
Influenza (gripe)		VACINAÇÃO ANUAL																			SIM, menores de 6 anos e maiores de 60 anos	SIM	SIM				
Febre amarela		EM REGIÕES COM RECOMENDAÇÃO DE VACINAÇÃO – Dose única a partir dos 9 meses de idade. A recomendação de uma segunda dose, especialmente para os vacinados antes de 2 anos de idade, não é consensual, mas deve ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.																			SIM	SIM	NÃO				
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)		Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, até 49 anos	SIM	NÃO					
Varicela (catapora)		Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM	SIM	SIM					
Hepatite A		Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, uma dose para menores de 5 anos	SIM	SIM					
HPV														Duas doses para meninas e meninos	Vacinar os não vacinados anteriormente. Para menores de 15 anos: duas doses. De 15 anos em diante: três doses.		Vacinar os não vacinados anteriormente, a critério médico (três doses)		SIM, duas doses. Meninas (9 a 14 anos) e meninos (11 a 14 anos)		SIM	SIM					
Pneumocócica 23 valente		Vacinar pessoas em situações especiais de risco																			Duas doses com intervalo de cinco anos		NÃO	SIM	SIM		
Herpes zóster																					De 50 a 59 anos: a critério médico		Uma dose		NÃO	SIM	NÃO
Dengue	CONTRAINDICADA													Recomendada para pessoas soropositivas para dengue, de 9 a 45 anos: três doses: 0 – 6 – 12 meses						CONTRAINDICADA		NÃO	SIM	NÃO			